



Randomizovaná studie – dlouhodobá léčba antibiotiky v případě přetrvávajících symptomů, které provázejí lymfskou boreliózu

Léčebné strategie v případě lymfské boreliózy jsou nejednotné. Zvláště pak v případě, že se jedná o perzistující symptomy s ní spojené.

V této randomizované studii autoři přistoupili k dlouhodobému podávání antibiotik u pacientů s příznaky a porovnávali ji s přínosem krátkodobé terapie.

Studie byla vytvořena jako randomizovaná, dvojité zaslepená za použití placeba, byla prováděná v Evropě. Byli do ní zařazeni pacienti s potvrzenou lymfskou boreliózou, u nichž symptomy přetrvávají. Orálně jim byl podáván doxycyklin (86 pacientů), klaritromycin + hydroxychlorochin (96 pacientů) nebo placebo (98 pacientů) po dobu 12 týdnů. Před studií samotnou byli všichni pacienti léčeni 2 týdny ceftriaxonem. Sledovala se převážně kvalita života pacientů. Ta byla hodnocena dle SF-36 části týkající se fyzického zdraví. Při porovnání jednotlivých skupin mezi sebou na konci léčby se výsledky nelišily, ovšem u všech testovaných skupin se stav zlepšil oproti baseline.

U pacientů tedy došlo ke zlepšení kvality života, ale nezdá se, že by souviselo s antibiotickou léčbou, neboť se stav pacientů, kteří dostávali antibiotika, nelišil od pacientů, kteří užívali placebo. Autoři uzavírají, že zde není další přidaná hodnota dlouhodobého podávání antibiotik ve srovnání s krátkodobou ATB terapií.

[Randomized Trial of Longer-Term Therapy for Symptoms Attributed to Lyme Disease](#)

NEJM, Vol. 374 No. 13, 31 March 2016

Top Articles:

- [Opioid Abuse in Chronic Pain — Misconceptions and Mitigation Strategies](#)
- [Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol](#)
- [Immersion Day — Transforming Governance and Policy by Putting on Scrubs](#)