

Afektivní poruchy u revmatoidní artritidy

Kromě opakující se bolesti, únavy a zvýšeného výskytu tělesného postižení mají jedinci s revmatoidní artritidou zvýšený výskyt některých duševních poruch, zejména afektivních poruch a výkyv nálad, což bývá často spojeno s chronickými bolestmi a záněty. Tento článek poskytuje přehled o mentálních komorbiditách u revmatoidní artritidy. Dále popisuje, jak tyto mentální patologické stavy interagují s chorobnými procesy, včetně poruchy regulace zánětlivých reakcí, s dlouhodobou bolestí a únavou a s rozvojem kognitivních a behaviorálních reakcí a poruch, které mohou naopak zhoršit fyzické zdraví. Poukazuje tak i na roli psychické intervence, která může být pro pacienty s RA přínosem a zlepšit jejich fyzický stav.

[Affective disturbance in rheumatoid arthritis: psychological and disease-related pathways](#)

Nature Reviews Rheumatology, Volume 12, Number 9, September 2016



Image courtesy of vectorolie FreeDigitalPhotos.net

Top Articles:

- [Rheumatoid arthritis: Disconnect in the effects of obesity on RA outcomes](#)
- [Inflammatory myopathies: Choosing the right biomarkers to predict ILD in myositis](#)
- [The brain–joint axis in osteoarthritis: nerves, circadian clocks and beyond](#)